

سفرشات برائے کاشتکاران

16 اپریل 2021ء

ملک محمد احمد، ناظم اعلیٰ زراعت (صلاح آپاٹی) پنجاب

- رہتنی، پتھریلی، غیر آباد، پانی کی کمی والی، بارانی اور نامووار زمینوں میں منافع بخش فصلوں / گھنے باغات کی کاشت بذریعہ ذرپ نظام آپاٹی کریں۔
- ماحولیاتی آلوگی پر قابو پانے، زرعی مدائل کی لائگت میں کمی لانے اور فی اکڑ زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے ذرپ نظام آپاٹی کو چلانے کے لیے سو مرسم کی تفصیل کروائیں۔
- فصلوں کی آپاٹی ضرورت کے مطابق موکی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ بارش کے دنوں میں نیشنی زمینوں میں فصلوں کی آپاٹی میں خصوصی احتیاط کریں۔
- تیزی سے رونما ہوتی موسمیاتی تبدیلوں کے پیش نظر موکی حالات پر ہر وقت نظر رکھیں اور زیادہ بارش کی صورت میں فصل سے پانی کی نکاسی کا مناسب بندوبست کریں۔



- گندم کی برداشت کے بعد اگلی فصل کاشت کرنے سے پہلے زمین کو لیزر لاینڈ لیور سے ہموار کریں۔
- کپاس کی فصل لائنوں میں کاشت کے لیے پہلی آپاٹی بوانی کے 30 تا 35 دن بعد اور بقیہ 12 تا 15 دن کے وقفے سے کریں جبکہ پھر یوں پر کاشت کے لیے بوانی کے بعد پہلا پانی 3 تا 4 دن، دوسرا اور چوتھا پانی 6 تا 9 دن کے وقفے سے کریں اور بقیہ پانی 15 دن کے وقفے سے لگائیں۔
- کمادی کی فصل کو اپریل کے میانے میں 20 تا 30 دن کے وقفے سے پانی دیں۔ واضح رہے کہ فصل کی آپاٹی کا دار و مدار موکی حالات پر ہوتا ہے۔ زیادہ گرم اور خشک موکی حالات میں فصل کو زیادہ پانی جبکہ سرد اور مرطوب موکی حالات میں کم آپاٹی کی ضرورت ہوگی۔



- مکنی کو عموماً 10 تا 12 مرتبہ پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسری طرف یہ فصل پانی کی زیادتی کیمی برداشت نہیں کر سکتی۔ لہذا بارش کے بعد فاتحہ پانی فوراً کھیت سے نکال دینا چاہیے۔ پھول آنے اور دانے کی دودھیا حالات میں فصل کو سوکا نہ آنے دیں۔
- سورج کمگہ کی بہار یہ فصل کی دوسری آپاٹی پہلے پانی کے 20 دن بعد کریں آلو کی فصل کو میدانی علاقوں میں بارشیں کم ہونے کی صورت میں زیادہ آپاٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم پہاڑی علاقوں میں آلو کی فصل کو بارشی پانی سے ہی سیراب کیا جاتا ہے۔ زمین میں نیجی کی مقدار موزوں رہنی چاہیے تاکہ زیر زمین آلوخیج طور پر نشوونما پاسکیں۔ نیجی کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے آلو کے سائز میں یکسانیت نہیں رہتی۔