

سفارشات برائے کاشتکاران

31 مئی 2021ء

ملک محمد احمد، ناظم اعلیٰ زراعت (صلاح آپاٹی) بخارا

- فصل کو پانی لگانے سے پہلے کھالا جات کی اچھی طرح سے صفائی کریں، یعنی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے جڑی بوٹی مارنے ہروں کا استعمال کریں تاکہ پانی کے بہاؤ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

- ٹیوب ویل / ڈرپ / سپر نکلنے نظام آپاٹی کے ساتھ فصل کی آپاٹی صرف صحیح یا شام کے اوقات میں کریں تاکہ بخاراٹ کی شکل میں پانی کا خیاع کم ہو۔ ڈرپ نظام آپاٹی کی مدد سے ٹنل میں لگائی گئی سبز پوں کی آپاٹی اور پانی میں حل پذیر کھادوں کا استعمال بذریعہ فریکلیشن شعبہ اصلاح آپاٹی کی جانب سے مہیا کردہ جدول آپاٹی کے مطابق جاری رکھیں۔ یاد رہے کہ مائع کھادوں کا استعمال پودے کو سالٹ انجری (Salt Injury) سے بچاؤ کے لیے بھی انہائی مدد گار ہے۔

- زمین میں نمی کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ماٹچر میٹر (Moisture Meter) کا استعمال کریں اور پانی کی مطلوبہ مقدار بروقت فراہم کریں۔



- دھان کی پنبیری کی منتقلی کے وقت کھیت میں پانی کی مناسب مقدار رکھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ کھیت میں پانی کی زیادتی کی صورت میں پودے تیر ہوا کو برداشت نہیں کر پاتے اور اکھڑ جاتے ہیں جبکہ پانی کی کمی کی صورت میں پودے گری کو برداشت نہیں کر پاتے اور مر جہانہ شروع کر دیتے ہیں لہذا دھان کی پنبیری کی منتقلی کے وقت کھیت میں پانی کی گہرائی ایک تاثویر ہائی رکھیں۔

- ڈائریکٹ سیڈر اس (DSR) کی کاشت کی صورت میں دھان کی فصل کو 5 تا 7 دن بعد پانی لگائیں اگر کاشت خشک زمین میں کی گئی ہو تو فصل کی کاشت کے فوراً بعد پانی ضرور لگائیں۔ انگور کے باغات کو مٹی کے مہینے میں ایک سال کے پودوں کو 6 لترنی پودافی دن، دوسال کے پودوں کو 9 لترنی پودافی دن، تین سال کے پودوں کو 15 لترنی پودافی دن اور چار سال اور اس کے بعد کے پودوں کو 21 لترنی پودافی دن پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ ڈرپ نظام آپاٹی کی مدد سے پودوں کی ضرورت کے مطابق سائنسی بنیادوں پر آپاٹی کے جدول تیار کیے جاتے ہیں۔

- ڈرپ نظام آپاٹی کے ذریعے فصلات کی آپاٹی کیلئے پانی میں نمکیات زیادہ ہوں تو یہ نمکیات ٹھوس صورت اختیار کر لیتے ہیں اور ڈرپریپر (Drippers) کے سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ان جمی ہوئی نمکیات (کاربونیٹ، آرزن، بائی کاربونیٹ، نیکلیٹ اور میٹیٹیٹ) کو صاف کرنے کے لیے تیزاب کا استعمال (Acid Treatment) کریں۔ ایسٹریٹیٹ کرتے ہوئے پانی کی pH کو 4 تک لا لیں اور جب یہ پانی آخری ڈرپریپر (Drippers) سے نکلا شروع ہو جائے تو سٹم کو 6 تا 8 گھنٹے کے لیے بند کر دیں۔ 6 تا 8 گھنٹے کے بعد سٹم کو چلا کر فرش والوز اور لیٹرل (Lateral) کھول کر سث فتنی نکال لیں اس کے بعد فصلات کی آپاٹی کریں۔

- کپاس کی بذریعہ ڈرل کا شیڈ فصل کی پہلی آپاٹی بوائی کے 30 تا 35 دن بعد اور بقیہ 12 تا 15 دن کے وقفے سے کریں جبکہ پڑیوں پر کاشت کے لیے بوائی کے بعد پہلا پانی 3 تا 4 دن، دوسرا، تیسرا اور چوتھا پانی 6 تا 9 دن کے وقفے سے کریں اور بقیہ پانی 15 دن کے وقفے سے لگائیں۔

- کینو کے باغات ($20' \times 20'$) کو مٹی کے مہینے میں ایک سال کے پودوں کو 22 لترنی پودافی دن، دوسال کے پودوں کو 30 لترنی پودافی دن، تین سال کے پودوں کو 46 لترنی پودافی دن، چار سال کے پودوں کو 72 لترنی پودافی دن اور 5 سالا یا اس سے زائد عمر کے پودوں کو 122 لترنی پودافی دن پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ پودوں کو پانی کی ضرورت کا انحصار پودوں کی اقسام، آب و ہوا اور موئی صورتحال پر ہوتا ہے۔